

Borup, den 10. august 2005

Til IP-ukrudtsgruppen

Summarisk referat af gruppens 2. møde tirsdag, den 9. august 2005 hos John Korshøj

Deltagere:

Paul Christensen (tovholder), Christian Greve, Henning Sørensen, John Korshøj, Lars Geil og Poul Nicholaisen.

Mødets indhold:

Gennemgang af de indhøstede erfaringer fra årets demonstrationsbehandlinger med ukrudtsbekæmpelse:

Lars Geil havde fremsendt fire fotos fra demonstrationsparceller taget den 7/8.

I *ubehandlet* optrådte en ret kraftig bestand af især kornblomst og melde, men intet græs. Ved *Roundup / MCPA* ($\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ l/ha) udbragt afskærmet med rækkegående Suzuki den 8/6 2005 var en meget fin effekt i striberne. Ved *mekanisk strigle* behandlet den 18/5 og 8/6 2005 var kun en meget beskeden effekt at se. Gruppen var enig om, at striglen ikke var relevant for praktisk dyrkning. Ved *simazin* (4 l/ha) bredsprøjtet den 30/5 2005 var en overraskende god effekt med meget fin virkning. Ved *Titus* (30 g/ha + Lissapol) bredsprøjtet den 30/5 2005 på en helt nyfremspiret vegetation var en overraskende dårlig effekt med praktisk talt ingen virkning at se.

Henning Sørensen arbejder med udvikling af en dug, der vædes af sprøjtevæske a'la weed wiper systemet til Roundup/MCPA.

Næste møde:

Afholdes hos Henning Sørensen i Horsens torsdag, den 16. marts 2006 kl. 10.00. Her vil Henning fremvise sit nye redskab af "afstygningsstypen", og vi skal drøfte demonstrationsplanerne for 2006.

Besigtigelse i felten:

Efter mødet beså deltagerne en nordmannskultur, hvor John Korshøj havde prøvet forskellige former for ukrudtsbekæmpelse:

Ubehandlet: Ret kraftig vegetation af pileurt, gederams, grå bynke, dueurt, burresnerre og stor-kenæb.

Roundup / MCPA (1 + 1 l/ha) med og uden ½ l Rapsodie (penetreringsolie) udsprøjtet afskærmet den 27/5 2005: Olien har ikke givet synlig forskel i de pågældende doseringer. Fin virkning; kun en smule frøkrudt.

MaisTer (150 g/ha) udsprøjtet afskærmet den 9/6 2005: Dårlig virkning; meget dueurt, burrester og storkenæb. Er måske udsprøjtet for sent på for stort ukrudt.

Terbuthylazin + Karmex (4 l + 1 kg/ha) bredsprøjtet den 10/4 2005: Dagens hit. Meget fin virkning, kun en smule stor nælde og grå bynke samt noget Stolt Henriks brandbæger.

Herudover havde John nogle nøjere afprøvninger af *MaisTer* med forskellige kombinationer af afskærmet / bredsprøjtning, tidspunkter (2/5 og 27/5 2005) og doseringer (50, 100 og 150 g/ha). Det var tydeligt, at doseringer under 150 g/ha var ikke interessante for praktiske dyrkere. Ved denne dosering fremkom stadig en stor mængde storkenæb, der ikke er følsom for midlet, samt en hel del burrester. Ved lavere doseringer fremkom uacceptable mængder pileurt, gederams, dueurt, burrester m.v.